

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 14 Μάιος 2021 19:34

Πρόσφατες ανακοινώσεις συνδέουν την έλλειψη βιταμίνης D με αύξηση του κινδύνου πρόκλησης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και των επιπλοκών του . [1].



□ □ □

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης
Ιατρός,
Ωτορινολαρυγγολόγος,
Οδοντίατρος,
Διδάκτωρ της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών
Τηλ: 2744023768,
0944280764, e-mail:
pharmas@otenet.gr
www.gelife.gr
www.pharmasgel.gr
www.gelife.gr
www.alteropedia.gr
www.gkelanto.gr
www.citacumil.gr
www.gelife.gr
www.vitaminh12.gr
www.zinc.gr
www.gkelimedicallexicon.
gr
www.gelipsicarcinon.gr



Κάθε σταγόνα του D3 Gkelin drops περιέχει 1000 IU (Διεθνείς Μονάδες) φυσικής βιταμίνης D3. Για τη δοσολογία του D3 Gkelin drops βλέπε: www.pharmagel.gr

[illegible]