

Untitled Document

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ή ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Οι αλλεργικές Ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις εκδηλώνονται με συμπτώματα από τη μύτη (αλλεργική ρινίτιδα), τους παραρρινίους κόλπους (ρινοκολπίτιδα), τα μέσα ώτα (καθ' υποτροπήν μέση ωτίτιδα), το λάρυγγα (καθ' υποτροπήν λαρυγγίτιδα), το στόμα (αλλεργική στοματίτιδα).

Οι ΩΡΛ αλλεργικές παθήσεις εκδηλώνονται σε ευαισθητοποιημένα σε διάφορα αλλεργιογόνα, ατοπικά άτομα. Ατοπικά άτομα χαρακτηρίζονται αυτά που συνθέτουν ειδικές ανοσοσφαιρίνες Ε (IgE) προς περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, τα οποία είναι συνήθως πρωτεΐνες ή γλυκοπρωτεΐνες. Τα αλλεργιογόνα αυτά προέρχονται από αλλεργιογόνα ανεμόφιλα φυτά, τα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού, επιθήλια οικόσιτων ζώων και διάφορες τροφές. (Tanabe, 2007).

Αλλεργιογόνα



ακάρι σκόνης σπιτιού



γύρη



τροφίμα

Τοπική επαφή
με τον επιπεφυκότα
και ρινικό βλεννογόνο





Αποκο
του μο
(σιτευ

Απελευθέρωση
των αλλεργικών
μεσολαβητών
προσταγλανδίνη D2

κύριος μεσολαβητής
ΙΣΤΑΜΙΝΗ


ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- δακρύρροια
- ερύθημα
- οφθαλμικός κνησμός



ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 03 Μάιος 2023 10:41

[illegible]

Researcher: EMAT, Mirakian R, Jones NS, Leech SC, Paroogue S,
 Research title: peptides for the management of allergic and non-allergic rhinitis, 2007