

Περίληψη άρθρου

Οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, δηλαδή η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Crohn είναι νόσοι π

Η δραστηριότητα της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου συνδέεται στενά με ψυχολογικά συμπτώματα. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει εντονότερο άγχος στους ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του

εντέρου κατά τη διάρκεια της έξαρσης των συμπτωμάτων της νόσου [1, 2]. Μια μελέτη σε ασθενείς με **ελκώδη κολίτιδα** κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, η ενδοσκοπικά επιβεβαιωμένη ενεργή φλεγμονή του βλεννογόνου σχετίζεται με περισσότερο ψυχολογικό στρες [3]. Γιαυτό παίζει ρόλο ο έλεγχος της φλεγμονής, τόσο για τη σωματική, όσο και για την ψυχολογική ευεξία των



Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Ιατρός,

Ωτορινολαρυγγολόγος,

Οδοντίατρος

Διδάκτωρ της Ιατρικής

Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών

Τηλ. 2744023768,

6944280764, e-mail:

pharmage@otenet.gr

www.gelis.gr

www.pharmagel.gr

www.orlpedia.gr

www.allergopedia.gr

www.gkelanto.gr

www.curcumin.gr

www.d3gkelin.gr

www.vitaminb12.gr

www.zinc.gr

www.gkelismedicallexicon.
gr

www.prolipsicarcinou.gr



For 5 days, 90% of the fish died. For 10 days, 100% of the fish died. For 15 days, 100% of the fish died. For 20 days, 100% of the fish died. For 25 days, 100% of the fish died. For 30 days, 100% of the fish died. For 35 days, 100% of the fish died. For 40 days, 100% of the fish died. For 45 days, 100% of the fish died. For 50 days, 100% of the fish died. For 55 days, 100% of the fish died. For 60 days, 100% of the fish died. For 65 days, 100% of the fish died. For 70 days, 100% of the fish died. For 75 days, 100% of the fish died. For 80 days, 100% of the fish died. For 85 days, 100% of the fish died. For 90 days, 100% of the fish died. For 95 days, 100% of the fish died. For 100 days, 100% of the fish died.

[illegible]



Η L-Θεανίνη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της προσοχής, ενισχύοντας έτσι τη λειτουργική μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες.

Background: H. pylori infection is a major cause of gastric cancer. The aim of this study was to investigate the prevalence of H. pylori infection in gastric cancer patients and to determine the relationship between H. pylori infection and gastric cancer. Methods: A total of 100 gastric cancer patients and 100 healthy controls were enrolled in the study. The prevalence of H. pylori infection was determined by histological examination of gastric biopsy specimens. Results: The prevalence of H. pylori infection was significantly higher in gastric cancer patients (85%) compared to healthy controls (45%). Conclusion: H. pylori infection is a major cause of gastric cancer and its eradication may reduce the risk of gastric cancer.