

Πολλοί γονείς παρατηρούν γύρω από τα μάτια των μικρών παιδιών τους μαύρους κύκλους. Αυτή η παρατήρηση κάνει όχι μόνο τους γονείς. Οι μαύροι κύκλοι γύρω από τα μάτια εμφανίζονται ταυτόχρονα και στα δύο μάτια και εντοπίζονται ομοιογενώς κυρίως στις περιοχές κάτω από τους οφθαλμικούς κόγχους.



Δρ Γκέλης Ν. Δημήτριος,
Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστ
□ Κόρινθος 20131, Τηλ. 2741026658, 6944280764

www.gelis.gr, □ □ □ □ □

www.curcumin.gr □ [www,gkelikosagiorgi](http://www.gkelikosagiorgi.gr) [wiki.gr](http://www.wiki.gr) □

[gr](http://www.orlpedia.gr)

□ □ □ □

www.orlpedia.gr

www.allergopedia.gr

www.d3gkelin.gr

Παρά το γεγονός ότι οι μαύροι κύκλοι γύρω από τα μάτια είναι πολύ συνηθισμένη κατάσταση υπάρχουν λίγες επιστημονικές ανακοινώσεις που περιγράφουν την παθογένεσή

τους. Οι μαύροι κύκλοι οφείλονται σε ποικίλους αιτιολογικούς παράγοντες, όπως η υπερβολική εναπόθεση μελανίνης στο δέρμα γύρω από τα βλέφαρα, η ύπαρξη λεπτού και διαφανούς δέρματος στο κάτω βλέφαρο και γύρω απ' αυτό, που καλύπτει το σφιγκτήρα μυ των βλεφάρων [1], μια μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση, που είναι δευτεροπαθής μιας ατοπικής ή αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής, το περικογχικό οίδημα, η επιφανειακή ύπαρξη αιμοφόρων αγγείων, και δημιουργία σκιάσεων συνεπεία χαλάρωσης του δέρματος [2]

.

αλλά και οποιονδήποτε ενήλικα του περιβάλλοντος του παιδιού να υποθέσει ότι το παιδί δεν είναι υγιές ή δεν κοιμάται καλά.

Η δημιουργία μαύρων κύκλων γύρω από τα μάτια γίνονται εντονότερα αισθητή στα παιδιά με ανοιχτόχρωμο δέρμα και οφείλονται σε διάφορες αιτίες. Οι μαύροι κύκλοι των ματιών των παιδιών μπορεί να εξαλειφθούν, αφού με τη βοήθεια του γιατρού εντοπιστεί η αιτία που τους προκαλεί. Οι συνηθέστερες αιτίες που δημιουργούν μαύρους κύκλους στο δέρμα γύρω από τα μάτια των παιδιών είναι η **αλλεργική ρινίτιδα**, η χρόνια **ρινοκολπιτιδα** και οι **υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού** και η **υπερτροφία των αδενοειδών v εκβλαστήσεων**

.

Αλλεργική ρινίτιδα

Μεταξύ των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας περιλαμβάνεται και το παρατεταμένο μούκωμα της μύτης. Το μούκωμα της μύτης οφείλεται σε συμφόρηση του ρινικού βλεννογόνου, δηλαδή τη λίμναση φλεβικού αίματος στα αγγεία του βλεννογόνου της μύτης. Στα παιδιά με μπουκωμένη μύτη οι φλέβες γύρω από τα μάτια είναι ανίκανες να παροχετευτούν στις ρινικές φλέβες που ήδη είναι γεμάτες με φλεβικό αίμα που λιμνάζει.

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 03 Μάιος 2023 10:15

