

Περίληψη άρθρου

Οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, δηλαδή η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Crohn είναι νόσοι π

Η δραστηριότητα της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου συνδέεται στενά με ψυχολογικά συμπτώματα. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει εντονότερο άγχος στους ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του

εντέρου κατά τη διάρκεια της έξαρσης των συμπτωμάτων της νόσου [1, 2]. Μια μελέτη σε ασθενείς με **ελκώδη κολίτιδα** κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, η ενδοσκοπικά επιβεβαιωμένη ενεργή φλεγμονή του βλεννογόνου σχετίζεται με περισσότερο ψυχολογικό στρες [3]. Γιαυτό παίζει ρόλο ο έλεγχος της φλεγμονής, τόσο για τη σωματική, όσο και για την ψυχολογική ευεξία των



Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης
Ιατρός,
Ωτορινολαρυγγολόγος,
Οδοντίατρος
Διδάκτωρ της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών
Τηλ. 2744023768,
6944280764, e-mail:
pharmage@otenet.gr
www.gelis.gr
www.pharmagel.gr
www.orlpedia.gr
www.allergopedia.gr
www.gkelanto.gr
www.curcumin.gr
www.d3gkelin.gr
www.vitaminb12.gr
www.zinc.gr
www.gkelismedicallexicon.
gr
www.prolipsicarcinou.gr



Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, MD, ORL, DDS, PhD - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 25 Σεπτέμβριος 2021 12:56

Αικατερίνη Γκέλη

Ιατρός,

Ακτινοδιαγνώστρια

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

στην Ιατρική Διατροφολογία,

Ακτινοδιαγνωστική και

Υπερηχογραφική

Διαγνωστική,

Περιβαλλοντική Ιατρική,

Συμπληρωματική Ιατρική.

Διεύθυνση Ιατρείου:

Παπαληγούρα 16, Άσσος

Κορινθίας, Τηλ. 2741087758,

6944644820 email:

kgkeli@hotmail.com

Ενδοκρινολογία, Γαστρεντερολογία, Νεφρολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, Ογκολογία, Γυναικολογία, Παθολογία, Ιατρική Διατροφολογία, Ακτινοδιαγνωστική, Υπερηχογραφική Διαγνωστική, Περιβαλλοντική Ιατρική, Συμπληρωματική Ιατρική.

Διεύθυνση Ιατρείου: Παπαληγούρα 16, Άσος Κορινθίας, Τηλ. 2741087758, 6944644820 email: kgkeli@hotmail.com



Η L-Θεανίνη μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της προσοχής, ενισχύοντας έτσι τη λειτουργική μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες.

Background: H. pylori infection is a major cause of gastric cancer. The aim of this study was to investigate the association between H. pylori infection and gastric cancer in a population-based cohort study. Methods: A population-based cohort study was conducted in the city of Hanoi, Vietnam. The study included 10,000 subjects who were followed up for 10 years. The subjects were divided into two groups: those who were infected with H. pylori and those who were not infected. The incidence of gastric cancer was compared between the two groups. Results: The incidence of gastric cancer was significantly higher in the H. pylori-infected group compared to the non-infected group. The relative risk of gastric cancer was 2.5 in the H. pylori-infected group. Conclusion: H. pylori infection is a major risk factor for gastric cancer. The results of this study suggest that the eradication of H. pylori infection may reduce the risk of gastric cancer.