Untitled Document

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ή ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Οι αλλεργικές Ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις εκδηλώνονται με συμπτώματα από τη μύτη (αλλεργική ρινίτιδα), τους παραρρίνιους κόλπους (ρινοκολπίτιδα), τα μέσα ώτα (καθ’ υποτροπήν μέση ωτίτιδα), το λάρυγγα (καθ’ υποτροπήν λαρυγγίτιδα), το στόμα (αλλεργική στοματίτιδα).

Οι ΩΡΛ αλλεργικές παθήσεις εκδηλώνονται σε ευαισθητοποιημένα σε διάφορα αλλεργιογόνα, ατοπικά άτομα. Ατοπικά άτομα χαρακτηρίζονται αυτά που συνθέτουν ειδικές ανοσοσφαιρίνες Ε (IgE) προς περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, τα οποία είναι συνήθως πρωτεΐνες ή γλυκοπρωτεΐνες. Τα αλλεργιογόνα αυτά προέρχονται από αλλεργιογόνα ανεμόφιλα φυτά, τα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού, επιθήλια οικόσιτων ζώων και διάφορες τροφές. (Tanabe, 2007).



Αλλεργιογόνα

ακάρι σκόνης σπιτιού

γύρη

τρ

Τοπική επαφή με τον επιπεφυκότα και ρινικό βλεννογόνο

Αποκ
του μ
(σιτευ

Απελευθέρωση των αλλεργικών μεσολαβητών

προσταγλανδίνη D_2

κύριος μεσολαβητής

ΙΣΤΑΜΙΝΗ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

- δακρύρροια
- ερύθημα
- οφθαλμικός κνησμός

[illegible] Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθ [illegible]



[illegible]

Scadding GK, Durham SR, Mirakian R, Jones NS, Leech SC, Farooque S, [illegible] guidelines for the management of allergic and non-allergic rhinitis. [illegible] 2007

[illegible] peptides and immunotherapy. Curr Protein Pept Sci. 2007