

Η κυψελίδα είναι μια κηρώδης λιπαρή ουσία ανάμεικτη με νεκρά κύτταρα του δέρματος του έξω ακουστικού πόρου του αυτιού, τρίχες, καθώς και με μικροοργανισμούς (βακτήρια της φυσιολογικής χλωρίδας του αυτιού,



Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής
Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο
Μονάδα Εφαρμογών Ακουστικών Βαρηκοΐας
Φλάμπουρο Λουτρακίου Κορινθίας,
Τηλ. 2744023768, 6944286764 dgk@otenet.gr
www.gelis.gr, www.pharmagelis.gr, www.gkelaqnto.gr



Εύδοξη Κωνσταντίνου (koni@yggyc.com) 13148076904 0366320580 (Hellas akustiker)




Παναγιώτης Γκέλης (gk@yggyc.com) 13148076904 0366320580 (Hellas akustiker)



Παναγιώτης Γκέλης (gk@yggyc.com) 13148076904 0366320580 (Hellas akustiker)

Μπορεί η κυψελίδα του αυτιού να επηρεάσει τη λειτουργία του ακουστικού βαρηκοΐας;©

Συντάχθηκε απο τον/την Δρ. Δημήτριος Γκέλης - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2024 20:57



Διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία του ακουστικού βαρηκοΐας δεν επηρεάζεται από την παρουσία της κυψελίδας του αυτιού, καθώς η λειτουργία του ακουστικού βαρηκοΐας βασίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ήχου, η οποία γίνεται μέσω του εξωτερικού επεξεργαστή και του εσωτερικού ηλεκτρονικού κυκλώματος που είναι ενσωματωμένο στην κυψελίδα του αυτιού.