

Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης

Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,

Διδάκτωρ Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ωτορινολαρυγγολογική Αλλεργία και το ροχαλητό

Ιατρείο Ωτορινολαρυγγολογίας

ΜΟΝΑΔΑ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ, Κορινθίας

Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100

Τηλ. 2741026631, 6944280764, e -mail:pharmage@otenet.gr

www.gelis.gr , www.orlpedia.gr , www. allergopedia.gr, www.pharmagel.gr , www.gkelanto.gr



Η τίγρη ανήκει στην οικογένεια των **Γαλιδώ ν (*Felidae*)**, του γένους των μεγάλων γαλών μαζί με το λιοντάρι, το **τσιτά (cheetahs)**, τη **λεοπάρδαλη**, τον **ιαγουάρο**, την **αρκτική λεοπάρδαλη**, και τη **νεφελωτή λεοπάρδαλη**. Ode Groot et al (1990) απέδειξαν ένα παρόμοιο μόριο με το Fel d 1 ότι υπάρχει σε οκτώ από τα 35 μέλη της οικογένειας των Γαλιδών, ήτοι του **αιλουροειδούς οκελότου**, του **πούμα**, του **σέρβαλ**, της **Σιβηριανής τίγρης**, του **λέοντος**, του **ιαγουάρου**, της **αρκτικής λεοπάρδαλης** και του **καρακάλ**.

Οι ανωτέρω ερευνητές έβγαλαν το συμπέρασμα ότι τα εκχυλίσματα τριχών που πάρθηκαν

από αυτά τα αιλουροειδή περιέχουν πράγματι ένα συστατικό παρόμοιο με το Fel d 1
.

Τσιτά (cheetahs) [*Akinonux jubatus*] στην **Τανζανία** . Ανήκει στην οικογένεια των **Γαλιδώ ν (*Felidae*)**, του γένους των μεγάλων γαλών μαζί με το **λιοντάρι**, την **τίγρη**, τη **λεοπάρδαλη**, τον **ιαγουάρο**, την **αρκτική λεοπάρδαλη**, και τη **νεφελωτή λεοπάρδαλη.**

(Φωτο:Christian Charisius/Reuters)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

de Groot H , van Swieten P , Aalberse RC . Evidence for a Fel d I-like molecule in the "big cats" (Felidae species). J Allergy Clin Immunol. 1990 Jul;86(1):107-16.

Perez-Santos C. Allergy to animals. 1995 IATROS Editions, Barcelona, Spain.

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2011 19:55)