

**Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης**

**Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος, Οδοντίατρος,**

**Διδάκτωρ Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνώ ν, Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ωτορινολαρυγγολογική Αλλεργία και το ροχαλητό**

**Ιατρείο Ωτορινολαρυγγολογίας**

ΜΟΝΑΔΑ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΧΑΛΗΤΟΥ, Κοριινθίας

Δαμασκηνού 46, Κόρινθος 20100

Τηλ. 2741026631, 6944280764, e -mail:pharmage@otenet.gr

www.gelis.gr , www.orlpedia.gr , www. allergopedia.gr, www.pharmagel.gr , www.gkelanto.gr

Η τίγρη ανήκει στην οικογένεια των **Γαλιδώ ν (*Felidae*)**, του γένους των μεγάλων γαλών μαζί με το λιοντάρι, το **τσιτά (cheetahs)**, τη **λεοπάρδαλη**, τον **ιαγουάρο**, την **αρκτική λεοπάρδαλη**, και τη **νεφελωτή λεοπάρδαλη**. Ode Groot et al (1990) απέδειξαν ένα παρόμοιο μόριο με το Fel d 1 ότι υπάρχει σε οκτώ από τα 35 μέλη της οικογένειας των Γαλιδών, ήτοι του **αιλουροειδούς οκελότου**, του **πούμα**, του **σέρβαλ**, της **Σιβηριανής τίγρης**, του **λέοντος**, του **ιαγουάρου**, της **αρκτικής λεοπάρδαλης** και του **καρακάλ**.

Οι ανωτέρω ερευνητές έβγαλαν το συμπέρασμα ότι τα εκχυλίσματα τριχών που πάρθηκαν

από αυτά τα αιλουροειδή περιέχουν πράγματι ένα συστατικό παρόμοιο με το Fel d 1
.

**Τσιτά (cheetahs) [*Akinonux jubatus*]** στην **Τανζανία** . Ανήκει στην οικογένεια των **Γαλιδών (*Felidae*)**, του γένους των μεγάλων γαλών μαζί με το **λιοντάρι**, την **τίγρη**, τη **λεοπάρδαλη**, τον **ιαγουάρο**, την **αρκτική λεοπάρδαλη**, και τη **νεφελωτή λεοπάρδαλη.**

(Φωτο:Christian Charisius/Reuters)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

de Groot H , van Swieten P , Aalberse RC . Evidence for a Fel d I-like molecule in the "big cats" (Felidae species). J Allergy Clin Immunol. 1990 Jul;86(1):107-16.

Perez-Santos C. Allergy to animals. 1995 IATROS Editions, Barcelona, Spain.

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2011 19:55)